

ALIUD® PHARMA GmbH
D-89150 Laichingen



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Ciprofloxacin AL 500 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ciprofloxacin

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Ciprofloxacin AL 500 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg beachten?
3. Wie ist Ciprofloxacin AL 500 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ciprofloxacin AL 500 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Ciprofloxacin AL 500 mg und wofür wird es angewendet?

Ciprofloxacin AL 500 mg ist ein Antibiotikum, das zur Gruppe der Fluorchinolone gehört. Der Wirkstoff ist Ciprofloxacin. Ciprofloxacin wirkt, indem es Bakterien abtötet, die Infektionen verursachen. Es wirkt nur bei bestimmten Bakterienstämmen.

Erwachsene

Ciprofloxacin AL 500 mg wird bei Erwachsenen zur Behandlung der folgenden bakteriellen Infektionen angewendet:

- Infektionen der Atemwege.
- Lang anhaltende oder wiederholt auftretende Entzündungen der Ohren oder der Nasennebenhöhlen.
- Harnwegsinfektionen.
- Infektionen der Hoden.
- Infektionen der Geschlechtsorgane bei Frauen.
- Infektionen des Magen-Darm-Trakts und Infektionen des Bauchraums.
- Infektionen der Haut und der Weichteilgewebe.
- Infektionen der Knochen und Gelenke.
- Behandlung von Infektionen bei Patienten mit einer stark verminderten Anzahl bestimmter weißer Blutkörperchen (Neutropenie).
- Vorbeugung gegen drohende Infektionen bei Patienten mit einer stark verminderten Anzahl bestimmter weißer Blutkörperchen (Neutropenie).
- Vorbeugung gegen Infektionen durch das Bakterium *Neisseria meningitidis*.
- Behandlung nach einer Inhalation von Milzbrandregenern.

Wenn Sie unter einer schweren Infektion leiden oder einer Infektion, die von verschiedenen Bakterientypen verursacht wird, werden Sie möglicherweise eine zusätzliche antibiotische Behandlung zu Ciprofloxacin AL 500 mg erhalten.

Kinder und Jugendliche

Ciprofloxacin AL 500 mg wird bei Kindern und Jugendlichen unter Aufsicht eines hierauf spezialisierten Arztes zur Behandlung der folgenden bakteriellen Infektionen eingesetzt:

- Infektionen der Lunge und der Bronchien bei Kindern und Jugendlichen, die an zystischer Fibrose leiden.
- Komplizierte Infektionen der Harnwege, einschließlich Infektionen mit Beteiligung des Nierenbeckens (Pyelonephritis).
- Behandlung nach einer Inhalation von Milzbrandregenern.

Ciprofloxacin AL 500 mg kann auch zur Behandlung von anderen speziellen schweren Infektionen bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden, wenn Ihr Arzt dies als notwendig erachtet.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg beachten?

Ciprofloxacin AL 500 mg darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ciprofloxacin, andere Chinolon-Präparate oder einen der sonstigen Bestandteile von Ciprofloxacin AL 500 mg sind (siehe Abschnitt 6. „Weitere Informationen“).
- wenn Sie Tizanidin anwenden (siehe Abschnitt 2. „Bei Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg mit anderen Arzneimitteln“).

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich

Vor der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg

- Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie:
- jemals Nierenprobleme hatten, da Ihre Behandlung eventuell angepasst werden muss.
 - unter Epilepsie oder anderen neurologischen Erkrankungen leiden.
 - in der Vergangenheit Sehnenprobleme bei einer früheren Behandlung mit Antibiotika wie Ciprofloxacin AL 500 mg hatten.
 - unter Myasthenia gravis leiden (ein Typ der Muskelschwäche).
 - in der Vergangenheit unter Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) gelitten haben.

Während der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg

Informieren Sie Ihren Arzt umgehend, wenn eines der folgenden Ereignisse während der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg eintritt. Ihr Arzt wird entscheiden, ob die Behandlung mit Ciprofloxacin AL 500 mg beendet werden muss.

- Schwere, plötzliche Überempfindlichkeitsreaktion (anaphylaktische Reaktion/anaphylaktischer Schock, Angioödem). Schon bei der ersten Einnahme besteht eine geringe Gefahr, dass Sie eine schwere allergische Reaktion erleiden, die sich in folgenden Symptomen äußern kann:
 - Engegefühl in der Brust.
 - Gefühl von Schwindel, Übelkeit oder
 - Drohende Ohnmacht oder Schwindelgefühl beim Aufstehen.

Sollte dies eintreten, beenden Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg und wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.

- Schmerzen und Schwellungen in den Gelenken und Sehnenentzündungen können gelegentlich auftreten, insbesondere wenn Sie älter sind und gleichzeitig mit Kortikosteroiden (Arzneimittel zur Behandlung bei Entzündungen) behandelt werden. Beim ersten Anzeichen von Schmerzen oder einer Entzündung beenden Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg und stellen Sie den schmerzenden Körperteil ruhig. Vermeiden Sie jede unnötige Anstrengung, da dies das Risiko eines Sehnenrisses erhöhen kann.

- Wenn Sie unter Epilepsie oder anderen neurologischen Erkrankungen wie zerebrale Ischämie oder Schlaganfall leiden, könnten Nebenwirkungen auftreten, die mit dem zentralen Nervensystem in Zusammenhang stehen. Wenn dies passiert, beenden Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

- Es ist möglich, dass psychiatrische Reaktionen nach der ersten Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg auftreten. Wenn Sie unter Depressionen oder einer Psychose leiden, können sich Ihre Symptome unter der Behandlung mit Ciprofloxacin AL 500 mg verschlimmern. Wenn dies passiert, beenden Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

- Es ist möglich, dass Beschwerden einer Nervenschädigung wie Schmerzen, Brennen, Kribbeln, Benommenheit und/oder Schwäche auftreten. Wenn dies passiert, beenden Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Während der Behandlung mit Antibiotika, einschließlich Ciprofloxacin AL 500 mg, und selbst mehrere Wochen nachdem Sie die Behandlung beendet haben, können Durchfälle auftreten. Bei starkem oder anhaltendem Durchfall oder wenn Sie feststellen, dass Ihr Stuhl Blut oder Schleim enthält, beenden Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg sofort, da dies lebensbedrohlich sein kann. Nehmen Sie keine Arzneimittel ein, die die Darmbewegung anhalten oder verlangsamen, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- Informieren Sie den Arzt oder das Laborpersonal, dass Sie Ciprofloxacin AL 500 mg einnehmen, wenn Sie eine Blut- oder Urinprobe abgeben müssen.

- Ciprofloxacin AL 500 mg kann Leberschäden verursachen. Wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen wie Appetitverlust, Gelbsucht (gelbliche Verfärbung der Haut), dunkler Urin, Juckreiz oder schmerzempfindlicher Bauch beenden Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

Ciprofloxacin AL 500 mg kann zu einer Verminderung der Zahl der weißen Blutkörperchen führen und Ihre Widerstandskraft gegen Infektionen kann vermindert werden. Wenn Sie eine Infektion mit

Symptomen wie Fieber und eine schwerwiegende Verschlechterung des Allgemeinzustandes oder Fieber zusammen mit lokalen Symptomen einer Infektion wie Hals-/Rachen-/Mundschmerzen oder Schmerzen beim Wasserlassen haben, sollten Sie umgehend Ihren Arzt aufsuchen. Eine Blutabnahme kann eine mögliche Verminderung der weißen Blutkörperchen (Agranulozytose) aufzeigen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt über alle Arzneimittel informieren, die Sie anwenden.

- Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie an einem Glucose-6-Phosphatdehydrogenasemangel (G6PD-Mangel) leiden, da sonst das Risiko einer Blutarmut (Anämie) bei Anwendung von Ciprofloxacin besteht.

- Ihre Haut reagiert empfindlicher auf Sonnenlicht und UV-Licht, wenn Sie Ciprofloxacin AL 500 mg einnehmen. Setzen Sie sich daher nicht starker Sonneneinstrahlung oder künstlichem UV-Licht, wie z. B. auf einer Sonnenbank, aus.

Bei Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wenden Sie Ciprofloxacin AL 500 mg und Tizanidin (Arzneimittel zur Entspannung der Skelettmuskulatur) nicht zusammen an, da dies Nebenwirkungen wie niedriger Blutdruck und Schläfrigkeit verursachen kann (siehe Abschnitt 2. „Ciprofloxacin AL 500 mg darf nicht eingenommen werden“).

Von folgenden Arzneimitteln ist bekannt, dass sie zu Wechselwirkungen mit Ciprofloxacin AL 500 mg in Ihrem Körper führen. Wird Ciprofloxacin AL 500 mg zusammen mit diesen Arzneimitteln angewendet, kann die therapeutische Wirkung dieser Arzneimittel beeinträchtigt werden. Außerdem kann sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen erhöhen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel anwenden:

- **Warfarin** oder andere **blutgerinnungshemmende Arzneimittel** zum Einnehmen (zur Blutverdünnung).
- **Probenecid** (bei Gicht).
- **Methotrexat** (bei bestimmten Krebserkrankungen, bei Schuppenflechte oder rheumatoider Arthritis).
- **Theophyllin** (bei Atembeschwerden).
- **Tizanidin** (zur Entspannung der Skelettmuskulatur bei multipler Sklerose).
- **Clozapin** (ein Antipsychotikum).
- **Ropinolol** (bei Parkinson-Krankheit).
- **Phenytoin** (bei Epilepsie).

Ciprofloxacin AL 500 mg kann die Konzentration der folgenden Arzneimittel in Ihrem Blut erhöhen:

- **Pentoxifyllin** (bei Kreislaufkrankungen).
- **Coffein**.

Einige Arzneimittel vermindern die Wirkung von Ciprofloxacin AL 500 mg. Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines dieser Arzneimittel anwenden oder anwenden möchten, wie z. B.:

- **Antazida** (Arzneimittel gegen Übersäuerung des Magens).
- **Mineralstoff-Ergänzungsmittel**.
- **Sucralfat** (bei Magen-Darm-Geschwüren).
- Einen **polymeren Phosphatbinder** (z. B. Sevelamer; bei hohem Phosphatspiegel im Blut)
- Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die **Calcium, Magnesium, Aluminium oder Eisen** enthalten.

Wenn Sie diese Präparate unbedingt benötigen, nehmen Sie Ciprofloxacin AL 500 mg circa 2 Stunden vorher oder nicht früher als 4 Stunden nachher ein.

Bei Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Sie können Ciprofloxacin AL 500 mg zu den oder außerhalb der Mahlzeiten einnehmen. Essen oder trinken Sie bei Einnahme der Tabletten nicht gleichzeitig Milchprodukte (wie Milch oder Joghurt) oder mit Calcium angereicherte Getränke, da diese Produkte die Aufnahme des Wirkstoffs aus dem Magen-Darm-Trakt beeinträchtigen können.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Vorzugsweise sollte die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg während der Schwangerschaft vermieden werden. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen.

Stillzeit

Wenn Sie stillen, dürfen Sie Ciprofloxacin AL 500 mg nicht einnehmen, weil Ciprofloxacin in die Muttermilch übergeht und Ihrem Kind schaden kann.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Ciprofloxacin AL 500 mg kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Es kann zu einigen Nebenwirkungen am Nervensystem kommen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie wissen, wie Sie auf Ciprofloxacin AL 500 mg reagieren, ehe Sie sich an das Steuer eines Fahrzeugs setzen oder Maschinen bedienen. In Zweifelsfällen fragen Sie bitte Ihren Arzt.

3. Wie ist Ciprofloxacin AL 500 mg einzunehmen?

Ihr Arzt wird Ihnen genau erklären, in welcher Dosis und Häufigkeit und über welchen Zeitraum Sie Ciprofloxacin AL 500 mg einnehmen müssen. Dies ist von der Art und Schwere der Infektion abhängig, an der Sie erkrankt sind.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn Sie unter Nierenproblemen leiden, da Ihre Dosis gegebenenfalls angepasst werden muss.

Die Behandlung dauert üblicherweise 5 bis 21 Tage, kann jedoch bei schweren Infektionen länger andauern. Nehmen Sie die Tabletten immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, wie viele Tabletten Sie einnehmen sollen und wie Sie Ciprofloxacin AL 500 mg einnehmen sollen.

- Nehmen Sie die Tabletten unzerkaut mit viel Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) ein. Sie sollten die Tabletten wegen ihres unangenehmen Geschmacks nicht kauen.

- Versuchen Sie, die Tabletten möglichst täglich zu etwa der gleichen Zeit einzunehmen.

- Sie können die Tabletten zusammen mit einer Mahlzeit oder unabhängig von den Mahlzeiten einnehmen. Eine Calcium-haltige Mahlzeit wird die Aufnahme des Wirkstoffs aus dem Magen-Darm-Trakt nur wesentlich beeinflussen. Nehmen Sie jedoch Ciprofloxacin AL 500 mg Tabletten nicht mit Milchprodukten, wie Milch oder Joghurt, oder mit Getränken, die mit Mineralstoffen angereichert sind (z. B. mit Calcium angereicherter Orangensaft), ein.

Achten Sie darauf, dass Sie während der Behandlung mit Ciprofloxacin AL 500 mg ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Ciprofloxacin AL 500 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Ciprofloxacin AL 500 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie mehr als die verordnete Dosis eingenommen haben, nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch. Nehmen Sie möglichst

Ihre Tabletten oder die Arzneimittelpackung mit, um sie dem Arzt zu zeigen.

Wenn Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg vergessen haben

Nehmen Sie die übliche Dosis schnellstmöglich ein und setzen Sie anschließend die Behandlung, wie verordnet, fort. Ist jedoch fast der Zeitpunkt für die Einnahme der nächsten Dosis gekommen, nehmen Sie die vergessene Dosis nicht ein, sondern fahren Sie, wie gewohnt, mit der Einnahme fort. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Achten Sie darauf, dass Sie den Behandlungsverlauf vollständig durchführen.

Wenn Sie die Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg abbrechen

Es ist wichtig, dass Sie den Behandlungsverlauf vollständig durchführen, auch wenn Sie sich nach einigen Tagen besser fühlen. Wenn Sie dieses Arzneimittel zu früh absetzen, ist es möglich, dass Ihre Infektion nicht vollständig geheilt wird und die Symptome der Infektion erneut auftreten oder sich Ihr Zustand verschlechtert. Es ist auch möglich, dass Sie eine Resistenz gegen dieses Antibiotikum entwickeln.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Ciprofloxacin AL 500 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Häufige Nebenwirkungen (1 bis 10 Behandelte von 100):

- Übelkeit, Durchfall.
- Gelenkschmerzen bei Kindern.

Gelegentliche Nebenwirkungen (1 bis 10 Behandelte von 1000):

- Superinfektionen mit Pilzen.
- Eine hohe Konzentration von eosinophilen Granulozyten (bestimmte weiße Blutkörperchen).
- Appetitverlust (Anorexie).
- Überaktivität oder Unruhe.
- Kopfschmerz, Benommenheit, Schlaf- oder Geschmacksstörungen.
- Erbrechen, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen wie Magenverstimmung (Völlegefühl/Sodbrennen) oder Blähungen.
- Anstieg bestimmter Substanzen im Blut (Transaminasen und/oder Bilirubin).
- Hautausschlag, Juckreiz oder Nesselsucht.
- Gelenkschmerzen bei Erwachsenen.
- Nierenfunktionsstörung.
- Muskel- und Knochenschmerzen, allgemeines Unwohlsein (Kraftlosigkeit) oder Fieber.
- Anstieg der alkalischen Phosphatase im Blut (eine bestimmte Substanz im Blut).

Seltene Nebenwirkungen (1 bis 10 Behandelte von 10 000):

- Durch Antibiotika ausgelöste Schleimhautentzündung des Dickdarms (Kolitis) (sehr selten mit möglichem tödlichen Ausgang; siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“).
- Veränderungen des Blutbildes (Leukozytopenie, Leukozytose, Neutropenie, Anämie), Verminderung oder Erhöhung eines Blutgerinnungsfaktors (Thrombozyten).
- Allergische Reaktion, Schwellung (Ödem) oder rasches Anschwellen von Haut und Schleimhäuten (Angioödem).
- Erhöhung des Blutzuckers (Hyperglykämie).
- Verwirrtheit, Desorientiertheit, Angstzustände, Alpträume, Depressionen oder Halluzinationen.
- Kribbeln, ungewöhnliche Empfindlichkeit auf Sinnesreize, herabgesetzte Empfindlichkeit der Haut, Zittern, Krampfanfälle (siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“) oder Schwindel.
- Sehstörungen.
- Ohrgeräusche (Tinnitus), Hörverlust oder vermindertes Hörvermögen.
- Herzjagen (Tachykardie).
- Erweiterung der Blutgefäße (Vasodilatation), niedriger Blutdruck oder Ohnmacht.
- Atemnot (einschließlich asthmatischer Symptome).
- Leberfunktionsstörung, Gelbsucht (Gallestauung) oder Leberentzündung.
- Lichtempfindlichkeit (siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“).
- Muskelschmerzen, Gelenkentzündung, gesteigerte Muskelspannung oder Krämpfe.
- Nierenversagen, Blut oder Kristalle im Harn (siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“), Entzündung der Harnwege.
- Flüssigkeitsretention oder übermäßige Schweißbildung.
- Abnormale Spiegel eines Blutgerinnungsfaktors (Prothrombin) oder erhöhte Spiegel des Enzyms Amylase.

Sehr seltene Nebenwirkungen (weniger als 1 Behandelte von 10 000):

- Bestimmter Typ der Verringerung roter Blutkörperchen (hämolytische Anämie), gefährliche Verminderung bestimmter weißer Blutkörperchen (Agranulozytose); Verminderung bestimmter roter und weißer Blutkörperchen und Blutplättchen (Panztyopenie), was lebensbedrohlich sein kann; und herabgesetzte Funktion des Knochenmarks, die ebenfalls lebensbedrohlich sein kann (siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“).
- Schwere allergische Reaktionen (anaphylaktische Reaktion oder anaphylaktischer Schock, mit möglichem tödlichen Ausgang, Serumkrankheit). (Siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“).
- Psychische Störungen (psychotische Reaktionen; (siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“).
- Migräne, Koordinationsstörung, unsicherer Gang (Gangstörung), Störung des Geruchssinnes (olfaktorische Störung), Erhöhung des Schädelinnendruckes (Hirndruck).
- Störungen beim Farbensehen.
- Entzündung der Blutgefäßwände (Vaskulitis).
- Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis).
- Absterben von Leberzellen (Lebernekrose), sehr selten bis hin zum lebensbedrohlichen Leberversagen.
- Kleine, punktförmige Einblutungen in die Haut (Petechien); verschiedene Hautveränderungen und -ausschläge (z. B. das gegebenenfalls tödliche Stevens-Johnson-Syndrom oder toxische epidermale Nekrolyse).
- Muskelschwäche, Sehnenentzündungen, Risse von Sehnen – insbesondere der großen Sehne an der Rückseite des Knöchels (Achillessehne; siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“); Verschlimmerung der Symptome einer Myasthenia gravis (siehe Abschnitt 2. „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ciprofloxacin AL 500 mg ist erforderlich“).

Häufigkeit nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- Beschwerden des Nervensystems wie Schmerz, Brennen, Kribbeln, Benommenheit und/oder Schwäche der Gliedmaßen.
- Schwere Herzrhythmusstörungen (Torsade de pointes), unregelmäßiger Herzrhythmus.

5. Wie ist Ciprofloxacin AL 500 mg aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen Ciprofloxacin AL 500 mg nach dem auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. Weitere Informationen

Was Ciprofloxacin AL 500 mg enthält

Der Wirkstoff ist Ciprofloxacin.

1 Filmtablette enthält 500 mg Ciprofloxacin als (Ciprofloxacin-hydrochlorid-Monohydrat).

Die sonstigen Bestandteile sind: Mikrokristalline Cellulose, Crospovidon, Hypromellose, Macrogol 400, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), hochdisperses Siliciumdioxid, Titandioxid (E171).

Wie Ciprofloxacin AL 500 mg aussieht und Inhalt der Packung

Filmtablette.

Weiß bis schwach gelbliche, ovale, gewölbte Filmtablette mit einseitiger Bruchkerbe und einseitiger Prägung „C500“.

Ciprofloxacin AL 500 mg ist in Packungen mit 10 und 20 Filmtabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
ALIUD® PHARMA GmbH
 Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen
 E-Mail: info@aliud.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im
 März 2009

Hinweis / Medizinische Aufklärung

Antibiotika werden für die Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt. Sie sind nicht wirksam gegen virale Infektionen (Infektionen durch Viren).

Wenn Ihr Arzt Ihnen Antibiotika verschrieben hat, brauchen Sie sie genau für Ihre derzeitige Krankheit.

Trotz Antibiotika-Behandlung können manchmal einige Bakterien überleben und weiter wachsen. Dieses Phänomen wird Resistenz genannt: Hierdurch können Antibiotika unwirksam werden.

Falsche Anwendung von Antibiotika begünstigt Resistenzentwicklungen. Sie können den Bakterien sogar helfen, resistent zu werden, und damit Ihre Heilung verzögern oder die antibiotische Wirkung verringern, wenn Sie Folgendes nicht beachten:

- Verordnete Dosierung.
- Häufigkeit der Einnahme.
- Dauer der Anwendung.

Um die Wirksamkeit dieses Arzneimittels zu gewährleisten, müssen Sie daher Folgendes beachten:

1. Nehmen Sie Antibiotika nur, wenn sie Ihnen verschrieben wurden.
2. Befolgen Sie genau die Einnahmeanweisungen.
3. Verwenden Sie kein Antibiotikum erneut ohne medizinische Verschreibung, selbst wenn Sie eine ähnliche Krankheit behandeln wollen.
4. Geben Sie Ihr Antibiotikum niemals einer anderen Person, da es möglicherweise ungeeignet für deren Krankheit sein kann.
5. Geben Sie nach beendeter Behandlung das nicht verwendete Medikament Ihrem Apotheker zurück, um eine sachgerechte Entsorgung zu gewährleisten.